

## CULTIVO DE COLIFLOR

**Botánica:** planta anual o bienal. La parte comestible es la inflorescencia (pella o cabeza), de color blanco, compacta y esférica, formada por pedicelos y botones florales apelmazados.

**Fisiología:** debe distinguirse entre formación de la "pella" y floración. La floración se realiza previa inducción por frío, pero la formación de la "pella" no siempre requiere inducción previa. Los cultivares tardíos (invernales) comparados con los tempranos (otoñales) tienen una fase juvenil más larga debido a un mayor número de hojas y además presentan requerimientos de vernalización y un límite de temperaturas de inducción menor para comenzar a formar la "cabeza".

### **Manejo:**

Organo de iniciación: semilla

Sistema de iniciación: almácigo y transplante

Momento de siembra: en Buenos Aires: a fines de primavera, principios de verano

Transplante: si la plántula es demasiado grande, las cabezas se formarán prematuramente, presentando menor número de hojas.

Labores culturales: similares a repollo

Fertilización: Es exigente en nutrientes, los cultivares precoces son sensibles a las deficiencias en Bo y Mo, debido al crecimiento rápido, ciclo vegetativo corto y producción elevada.

Cosecha: manualmente cortando con cuchillo las cabezas acompañadas con algunas hojas envolventes. Epocas calurosas: diariamente, Epocas frías: cada 2 ó 3 días

**Rendimiento:** 11 a 15 t/ha

**Comercialización:** cajones de madera (jaulas) con capacidad para 15 Kg

### **Factores adversos:**

Enfermedades fisiogénicas: Planta ciega (*blindness*); Arrozado (*riceness*); Abotonado (*buttoning*); Corazón negro